

Comprendre et utiliser le report sur pied des végétations

«*Le report sur pied, c'est quoi exactement ?*». Le report sur pied est la capacité d'une végétation à maintenir, après sa période de croissance (végétation mûre), une valeur alimentaire correcte (rendement, valeur nutritive et appétence). C'est également une technique d'élevage pour gérer l'équilibre entre le pâturage et le fourrage stocké, qui s'applique dans tous les systèmes utilisant des végétations diversifiées.

Pourquoi s'y intéresser ?

◆ Pâture ou faucher tard

Avec un report pouvant aller de 1 à 8 mois après l'épiaison des graminées. «*L'utilisation tardive de certaines parcelles est pratique car c'est impossible d'être en phase partout avec la pousse de l'herbe*».



Si l'on accepte de considérer que les ruminants digèrent les fibres et en tirent profit pour couvrir leurs besoins, il est possible de mettre en œuvre la technique du report sur pied.

◆ Sécuriser le système d'alimentation

Le report permet d'avoir moins besoin de fourrage récolté et s'adapter aux variations météo saisonnières. «*Cela me permet d'avoir une sécurité par le pâturage en été ou en hiver selon les stocks de foin*».



Il n'est pas rare de voir des éleveurs faucher au mois de mai pour distribuer du foin à partir de la fin juin. Or, le coût associé à cette mécanisation pour la récolte et la distribution n'est pas neutre dans la comptabilité des exploitations.

◆ Créer de la ressource au pâturage en été ou en hiver

Répartir la disponibilité fourragère. «*Ces végétations peuvent être pâturées quand les autres surfaces ne poussent plus*».



Les milieux hétérogènes ont un bon report sur pied, et il est possible d'alimenter des bovins à forts besoins même l'été sur ce type de végétation.

◆ Améliorer la valeur alimentaire des pâtures et faciliter la mise à l'herbe

Mélanger refus et repousses pour offrir un meilleur équilibre en fibre dans la ration et éviter de broyer ou faucher les refus. «*C'est une question de mentalité ; il faut penser ce qui est bon. Je fais des grands parcs, mes vaches mangent tout*».



Dans les repousses, les feuilles sont abondantes et les fibres absentes, ce qui risque de créer des acidoses chez les animaux.

Quelques idées habituelles à remettre en question :

L'herbe non mangée est toujours perdue :

VRAI FAUX

Les végétations diversifiées ont un bon report sur pied :

VRAI FAUX

Les ruminants digèrent mal les fibres :

VRAI FAUX

Comment valoriser le report sur pied ?



Identifier les végétations qui ont cette aptitude	Page 2
Prendre confiance dans les compétences du troupeau	Page 3 et fiche « <i>préférences alimentaires</i> »



Identifier les végétations qui ont une bonne aptitude au report sur pied

Le report sur pied est fort dans les milieux diversifiés et hétérogènes comme les milieux humides, les sous-bois, les landes, les pelouses et les prairies riches en espèces. Il dépend de la flore et des conditions du milieu.

● Les processus en cause


A l'échelle de la plante

--> **Certaines plantes conservent leur valeur nutritive même après leur floraison**, leur partie aérienne reste verte avec une bonne résistance à la sécheresse. Inversement les parties aériennes des graminées les plus productives et précoces se dégradent rapidement au cours de la croissance (sénescence des feuilles et des tiges).

--> **Les repousses sont en croissance végétative** et n'ont pas d'arrêt programmé par la floraison, elles ont donc des capacités de report plus importantes, si le climat le permet.

--> **Le report sur pied favorise la mise en réserve** des plantes et donc leur capacité de croissance.

--> **Le déprimage ralentie ou stoppe la mise à graine** et relance la croissance végétative.



Disponibilité alimentaire selon l'aptitude au report sur pied des végétations.

A l'échelle de la végétation

--> **La diversité de la flore étale la croissance** globale de la végétation.

--> **Les buissons et les arbres créent un effet parasol** et des abris, maintiennent la fraîcheur et offrent des feuillages ou fruits comestibles jusqu'à l'automne.

--> **Le « pailleux » protège les repousses ou semis, tard en saison** (sécheresse, vent, neige...).



Les milieux diversifiés ont un bon report sur pied.

● En pratique : Comment observer le report sur pied ?

Bonne aptitude

- 1• Forte diversité des graminées et autres plantes
- 2• Plantes à bonne aptitude : graminées à feuilles fines ou rondes dominantes (*molinie, canches, brachypode, carex, jonc, légumineuses...*)
- 3• Arbustes, arbres, forte hétérogénéité du milieu (effet parasol jusqu'à l'hiver)
- 4• Milieu humide, bonne réserve hydrique

Si on frotte entre les mains une plante mûre : les feuilles sont résistantes, souples, peu coupantes ou laissent des traces vertes.

Mauvaise aptitude

- 1• Diversité floristique faible
- 2• Peu d'hétérogénéité du milieu
- 3• Plantes à mauvaise aptitude : graminées à feuilles larges, productives et précoces (*ray gras, dactyle, flouve, houlque, vulpins...*)
- 4• Pelouse précoce (*brome dominant...*) plus ou moins dégradée (*chiendent, indicateurs d'épuisement...*)

Si on frotte entre les mains une plante mûre : les feuilles sont en morceau ou en poussière, abondance de nécroses.



Prendre confiance dans les compétences du troupeau pour valoriser les végétations mûres.

Les fourrages à bon report sur pied ont une bonne valeur alimentaire dès lors qu'ils sont volontairement consommés par le troupeau.

● Les processus en cause

--> **La performance zootechnique est associée à la quantité de nutriments consommés** et non pas seulement à la concentration en nutriments des plantes.

--> **Les fibres sont transformées en sucre.** Les animaux habitués à manger ce type de fourrages parviennent à digérer les parois des végétaux (flore ruminale spécifique).

--> **La diversité stimule l'appétit :** la diversité des formats de végétation (petites et grosses bouchées) augmente la motivation alimentaire des animaux au pâturage et à l'auge (relance de l'ingestion). La quantité ingérée peut être le double de celle attendue, notamment dans les situations où plusieurs types de végétation complémentaires se succèdent le long du cheminement des animaux.

--> **La vitesse d'ingestion des fourrages grossiers est très rapide** (grosses bouchées), ce qui améliore le niveau d'ingestion global au cours des repas.

--> **La consommation de fourrages fibreux nécessite des phases de repos et de rumination** (temps de vidange du rumen). Ceci influe directement sur l'appétit.



La présence de buissons est favorable au report sur pied.



Un mode d'exploitation estival, qui laisse aux graminées plus lentes le temps de mettre en réserve et de rentrer en reproduction : une parcelle lente à démarrer mais avec un bon report sur pied estival.

● En pratique : Comment prendre confiance ?

--> **Progresser en observant d'abord la situation du report sur l'exploitation** et les intérêts qu'il pourrait avoir. Vérifier les compétences du troupeau et favoriser l'apprentissage des animaux à consommer des fourrages fibreux (découverte dès le sevrage des jeunes, adultes compétents, etc.).

--> **Dans les parcelles utilisées en report, éviter de favoriser les plantes réputées comme meilleures fourragères** car elles sont précoces et supportent mal le report sur pied.

--> **Prévoir dans la succession des pâturages la transition alimentaire vers des végétations de plus en plus fibreuses.** Veiller à ne pas démotiver les animaux en leur apportant des fourrages distribués inadaptés ; chercher au contraire à apporter des compléments qui vont stimuler l'ingestion ou la digestion des fibres.

--> **Construire des parcs qui intègrent des végétations diversifiées et des zones de repos fonctionnels** (accueil de l'ensemble du troupeau). Respecter le rythme d'activité des animaux et allonger le temps de pâturage. Par exemple mettre les animaux au pâturage la nuit en été, car ils se reposent pendant les heures chaudes.




Ressources complémentaires bois frais/prairie mûre.



Pâturage bovin allaitant en report sur pied (1 mois) : avant/après
« Si tu commences par leur donner quelque chose qui ne leur plaît pas, elles ne vont pas être contentes. Mais une fois qu'elles ont commencé c'est bon ».

Piloter le report sur pied selon les saisons



Afin d'alimenter cette fiche technique, faites part au réseau de votre témoignage !

Des ressources pour aller plus loin

Cette fiche fait partie de la collection d'outils techniques éditée par le réseau Pâtur'Ajuste mettant en valeur les savoirs faire des éleveurs autour de la valorisation des prairies naturelles et des parcours dans les systèmes d'élevages. Pour en savoir : www.paturajuste.fr

Faites part de votre expérience...

Vous pouvez contribuer à cette fiche en ajustant certaines pratiques chez vous. Ne négliger pas l'intérêt de faire un suivi des moyens mis en œuvre et des résultats et à faire part de votre expérience au réseau à l'adresse : contact@paturajuste.fr

Pour découvrir des retours d'expérience d'éleveurs : RDV dans la rubrique «Parlons technique» du site Internet !

Rédaction : SCOPELA
Mise à jour : 20 septembre 2014



Avec la participation et le soutien financier de :

